

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

NORMAS RECOGIDA ORINA PARA ESTUDIO DE CITRATO Y

OXALATO

CITRATO

- En el servicio de Análisis Clínicos, se recogerá previamente el recipiente necesario para orina de 24 horas de lunes a viernes en horario de mañanas.
- El paciente debe comenzar a recoger la orina por la mañana, en cualquier día, excepto sábado y vísperas de festivos. Debe desechar la primera orina de la mañana.
- Se debe recoger toda la orina emitida en 24 horas. Conservar el recipiente en la nevera durante la recogida.
- La última orina recogida será la primera orina de la mañana siguiente.
- Si presenta determinación de análisis de orina normal, haga todo igual, pero comience recogiendo la primera orina de la mañana, y la del día siguiente se recogerá para el análisis de orina en frasco de boca ancha de tapón azul.
- Para la determinación de citrato en niños pequeños o bebés, se recogerá orina aislada en frasco de boca ancha de tapón azul.
- Una vez obtenida la muestra, se entregará en el Servicio de Análisis clínicos y se advertirá al personal que es una prueba especial.

OXALATO

- En el servicio de Análisis Clínicos, se recogerá previamente el recipiente necesario para orina de 24 horas de lunes a viernes en horario de mañanas.
- En los casos que los recipientes ya contengan ácido clorhídrico incorporado (deben estar debidamente señalizado este hecho), evitar en todo momento orinar directamente en el recipiente, debe recogerse en frasco de tapón azul u otro recipiente limpio y seco, y posteriormente, verterlo con cuidado en el recipiente evitando que salpique. Debe manejar con cuidado el recipiente porque contiene ácido, evitando en todo momento el contacto con piel y/o mucosas.
- 48 horas antes debe evitar tomar alimentos ricos en vitamina C (frutas, como naranja, fresas, kiwi, pomelo, suplementos vitamínicos con vitamina C y verduras como espinacas, brócoli, tomates, pimientos, entre otros.
- El paciente debe comenzar a recoger la orina por la mañana, en cualquier día, excepto sábado y vísperas de festivos. Debe desechar la primera orina de la mañana.
- Se debe recoger toda la orina emitida en 24 horas. Conservar el recipiente en la nevera durante la recogida.
- La última orina recogida será la primera orina de la mañana siguiente.
- Si presenta determinación de análisis de orina normal, haga todo igual, pero comience recogiendo la primera orina de la mañana, y la del día siguiente se recogerá para el análisis de orina en frasco de boca ancha de tapón azul.
- Para la determinación de citrato en niños pequeños o bebés, se recogerá orina aislada en frasco de boca ancha de tapón azul. El personal del laboratorio que recoja la muestra, añadirá los traspasará a un tubo de orina y le añadirá una gota de ácido clorhídrico como conservante.

- Una vez obtenida la muestra, se entregará en el Servicio de Análisis clínicos y se advertirá al personal que es una prueba especial y procederá a añadir 1 mL de ácido clorhídrico como conservante.